

Valutazione dell'efficacia e della tollerabilità di un prodotto "SALIPIL"[®] (Canova) nel trattamento coadiuvante dell'acne comedonica-papulo-pustolosa

Maria Pia De Padova, Colombina Vincenzi, Nicola Venturo, Antonella Tosti

Dipartimento di Medicina Clinica Specialistica e Sperimentale
Sezione di Clinica Dermatologica, Università di Bologna, Direttore Prof. Claudio Varotti

Scopo di questo studio è stato valutare l'efficacia e la tollerabilità di **SALIPIL**[®] crema come trattamento domiciliare nei soggetti sottoposti a peeling con acido salicilico per acne comedonica-papulo-pustolosa di lieve e media entità.

MATERIALI E METODI

15 Casi

10 ♀
5 ♂

17- 40 anni

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

- 1) Trattamento domiciliare con **SALIPIL**[®] a sere alterne per tre settimane
- 2) Peeling con acido salicilico 25% in 10 casi
Peeling con acido salicilico (maschera) 15% in 5 casi
- 3) Trattamento domiciliare quotidiano con **SALIPIL**[®] per tre settimane
- 4) Peeling con acido salicilico al 25% o al 15 %
- 5) Trattamento domiciliare quotidiano con **SALIPIL**[®] per tre settimane
- 6) Peeling con acido salicilico al 25% o al 15 %

PEELING CON ACIDO SALICILICO 25%



Prima



Durante il peeling



Dopo


PEELING CON ACIDO SALICILICO (maschera) 15%



Prima



Durante il peeling



Dopo

VALUTAZIONE CLINICA



Prima



Dopo



Prima



Dopo

SALIPIL[®] Crema è stata ben tollerata da tutti i soggetti trattati ed a nostro parere rappresenta un valido complemento al trattamento dell'acne con peeling all'acido salicilico.